# NOTICE

SUR LI

# TITRES & TRAVAUX

Scientifiques

DR JEAN M. C. ARTIGALAS

#### TITRES HOSPITALIERS

Interne des Hôpitaux de Montpellier 1878.

Médecin Stagiaire à l'Hôpital militaire du Val-de-Grâce, du 1<sup>st</sup> Novembre 1880 au 1<sup>st</sup> Novembre 1881.

Médecin side-major à PHôpital militaire S'-Martin (Paris), du 1"Novembre 1881 au 1"Novembre 1883, Pendant ce temps détaché deux fois en la même qualité à l'hôpital militaire thermal de Barèges.

Médecin-adjoint des Hôpitaux de Bordeaux, N° 1 du concours du I4 décembre 1883.

A ce titre, chargé des services hospitaliers suivants: Du 1<sup>er</sup> au 31 Janvier 1884, Clinique médicale des Enfants. Médecin-adjoint à l'hôpital Saint-André à la date du 28 janvier 1880 et, à ce titre, a fait les services suivants :

Du 1er au 31 mai 1887. Service de M. le Dr Solles.

Du 1se au 31 juin 1888. Service de M. le D' Solles.

Avril 1889, Service de M. le D' Verdalle.

Du 20 février au 28 mars 1889. Service de M. le D' Mandillon.

Médecin en chef de l'Hospice général de Pellegrin, chargé du service de l'Isolement, du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 1890.

## SUPPLÉANCES HOSPITALIÈRES FAITES A TITRE DE PROFESSEUR AGRÉGÉ

De M. le Professeur Picot, du 1er avril au 1er mai 1884. De M. le Professeur Picot, du 1er avril au 1er mai 1887. De M. le Professeur Picot, du 1er août au 15 octobre 1888. De M. le Professeur Picot, du 1er août au 22 août 1889. Désigné jusqu'au 15 octobre, en a été empêché par une

2ms classe de réserve.

période d'appel de 28 jours comme médecin major de De M. le Professeur Pitres, du 1er avril au 20 avril 1890.

Du chargé du Cours de clinique médicale des enfantsdu 28 Juillet au 22 août 1890.

# TITRES UNIVERSITAIRES

- Préparateur du cours de Physiologie au laboratoire des Hautes-Études, près la Faculté de médecine de Montpellier, du 11 avril 1878 au 11 avril 1880.
  - Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux (section de médecine), concours de 1883 (arrêté du 14 mars 1883),

#### RÉCOMPENSES UNIVERSITAIRES

1<sup>er</sup> prix des Élèves de 1<sup>er</sup> année de la Faculté de Médecine de Montpellier 1876-77. --- Médaille d'argent,

1<sup>er</sup> prix des Élèves de 2<sup>er</sup> année de la même Faculté 1877-78, --- Médaille d'argent.

1º Mention honorable du concours de la même Faculté pour les Élèves de 3ºn année 1878-79.

# TITRES ACADEMIQUES

Membre titulaire de la Société d'Hygiène publique de Bordeaux.

#### ENSEIGNEMENT

Conférences au laboratoire de physiologie à la Faculté de Mo ntpellier1877-78.

#### Sujets de travaux pratiques :

Respiration. — Mécanisme. — Respiration des muscles. — Circulation. — Rythme cardiaque. — Révolution cardiaque. — Cardiographes. — Sphygmographe. — Digestions artificielles. — Fistules gastriques. — Fistule duodénale. — Fistule hépatique. Conférences Libres de Clinique médicale faites à l'Hôpital Saint-André pendant les vacances de 1888.

Principaux sulets des lecons :

De l'audisepsie médicale. — Pathogénie de l'urémie. — Dilatsido de l'estomac. — Dilatsido de l'estomac. — Dilatsido de l'estomac. — De la pleurésie florieuse aigue. — De la principale. — De la pleurésie florieuse aigue. — De la principale. — De la forme de la corde supérieure de l'injuté assertie de la corde supérieure de l'injuté mais les pleurésies. — De la forme de la corde supérieure de l'injuté mais les pleurésies. — De la forre debut de la tubercolore pulmosaire. — Bettocongique de début de la tubercolore pulmosaire. — Bettocongique de début de la tubercolore pulmosaire. — la méthode de Ch. Bouchard. — De la preumoule aignée upoint de vue de l'auscutation. — Sur le com aignée tipon de l'auscutation. — Sur le com aignée tipon. — Sur un cas d'urémie legiée à pre échamptique. Sur quatre cas d'urémie rapide à type échamptique.

Certaines de ces leçons ont été publiées, les autres le seront très-prochainement. L'auteur a attendu des observations plus nombreuses pour motiver ses conclusions Cours de Médecine légale, par désignation du Doyen, M. Pitres, en remplacement de M. Morache, empêché, pendant le 1st semestre de 1889, du 21 Février au 15 Mars.

Dix leçons ont été faites dans ce laps de temps sur les sujets suivants :

Biessures par armes de guerre: Explosifs. — Mode d'action des projectiles. — Déformation des projectiles. — Blessures de la title par armes à feu. — Biessures du crâne. — Biessures de la face. — Biessures du con et thorax. — Blessures de l'abdomen et membre supérieur. — Biessures du membre inférieur. — Biessures. — Aspect selon les distanons. — Expériences.

Pour faire utilement ce cours, et bien des points paraissant obscurs à l'auteur sur le programme à traiter, des expériences nombreuses ont été faites au prix des plus grandes difficultés. Ces expériences, comme on le verra plus loin, ont donné des résultats intéressents, notamment aux points de vue :

- 1º Pénétration des projectiles des armes nouvelles.
- 2º Dimensions relatives des orifices d'entrée et de sortie des projectiles.
- 3º Tatouage dans les coups de feu.
- A ce point de vue spécial, les recherches faites paraissent avoir démontré que le tatouage variait : 1º Suivant la

qualité de la poudre, 2º Suivant l'âge de la cartouche, 3º Suivant la distance.

Cours Complémentaire de Bactériologie, semestre d'été de 1884-85.

Ces cours ont été faits par les Agrégés, avec autorisation ministérielle, et le Doyen, M. Pitres, en a donné l'appréciation suivante dans le discours de rentrée des Facultés:

MM. Artigalas, etc., etc., ont éé autorisés par M. On-Miniser à faire des cours complémentaires quit de ouinuercot cette année arec un dérontement dout ou doit leur savoir le plus grand get, cer le manque d'étaulétie de notre budget u'u pas permis de trouver des resources pour rétribuer MM. les Agrégée, dout les locous, très suivires par les élères, complétent heureusement certaines lacueus de l'Enseirenment officiel de la Paculité.

Sujet du cours : Notions élémentaires de Bactériologie.

#### Titres des leçons :

De l'actinomycose. — Des microbes en général.—Technique microbienne. — Cultures et inoculations. — Essai de thérapeutique microbienne générale. — Exposé général des maladies infectiennes. — Notions générales sur le bacille de la tuberculose. — Topographie bacillaire dans la tuberculose — De la tuberculose zooglétique. — Ino-

culabinte et prophylaxie de la tuberculose. — De la pucumonie, maladie infectieuse générale. — De la paeumonie, maladie épidémique. — De la pneumonie, maladie contagieuse et inoculable. — Topographie des microbes de la pneumonie. — Des microbes de la pneumonie. — Résumé du cours.

Cours complémentaire de Bactériologie en 1885-86.

Suiets du cours :

Fièvre typhotéle. — Choléra asiatique. — Choléra nostras. — Fièvre jaune. — Variole. — Scarlatine. — Rougeole. — Péripoeumonie bovine. — Charbon bactéridien. — Fièvre intermittente. — Etude sur les piomatines et la promatinéemie.

Ces leçons ont été théoriques et pretiques ainsi que les ressources mises à la disposition de l'auteur le permettisient. L'auteur a montré des cultures de tous les microbes dont il parlait et dans ses démonstrations s'est servi de projectious à la lumière oxylydrique. Des expériences sur les inoculations ont été plusieurs fois pettajuées, notamment pour le choléra.

M. le professeur Cornil avait eu la bienveillance de donner à l'auteur des cultures pures de la plupart des microhes étudiés. Cours complémentaire de Bactériologie 1886-87.

Sujets principeux du cours :

Microorganismes de la suppuration. — Du furoncle. — De l'antirax. — De l'érysipèle. — De l'ostéomyélite. — De la diphthérie. — De l'entérite des enfants. — De la fiévre typhot-de. — De la pneumonie, etc.

Pendant ces leçons, l'auteur a isolé le microbe de la diphthérie et commencé des recherches sur son atténuation. Malgré les variations de terrain et de culture, les résultats obtenus ont été l'inverse de ceux cherchés. Le microbe a pris une toxicité extraordinaire.

Cours complémentaire de Bactériologie 1887-88.

Sujets principaux du cours :

Notions générales de microbiologie. — Technique. — Cultures et inoculations. — Expérimentations sur les maladies microbiennes. — Microbes des fièrres éruptives : Variole. — Rougrole. — Scarlaine. — Rabéole. — Variolotée. — Variolotée de la Sepciémine. — Variations dans les conditions d'existent et le depri de svicicle du ribrion septique selon le terrain de culture — Essais de millieux Hérapeutiques. — Agar agar papionise avec proportions diverses de ; a d'ucide phécien.

b) d'acide salycilique et de salycilates-

c) de sublimé corrosit.

d) avec atmosphère imprégnée de vapeurs des agents ei-

Des résultats out été obtenus, mais les conelusions n'étaient pas complètes, l'auteur ne les a pas encore publiées.

Cours complémentaire de Bactériologie 1888-89.

Sujets principaux des cours :

Microbes de la fièvre typhoide — De la pneumonie — Du tétanos — Du charbon — De la pneumonie — De l'érysipèle — Du typhus — Du choléra asiatique — De la fièvre jaune.

Cours complémentaire de Séméiologie médicale 1890.

Sujets des leçons qui ont été faites sur des malades, comme exercices pratiques de clinique :

Hypertrophie cardisque. - Tuberculose pulmonaire. - Genéralités de technique. L'Ideison cardisques. - Topographie du cour. - Physiologie. - Pathologie. - Tathologie setta cardisques. - Gottre expothalanique. - Héniplégie droite. - Electroquesteur d'un andervisan de Tactor. - Topographie du cervea unoteur - Pleuriseis guache. - Tuberculose au début - Adénopathie resieho breuchiques. - Poumotorax tuberculose; - Pal.

disme. — Hématocele péri-utérine. — Arthropathies tabétiques — Piesmonthorax et malatie mitrale — Parapôgie dans le mai de Pott. — Auglies certaitoneuse. — Baydans le mai de Pott. — Auglies certaitoneuse. — Buppithérie. — Diphthérie. — Diphthérie. — Diphthérie. — Diphthérie. — Diphthérie. — Hémiphégie droite et sphasie.— Ethumatisme atriculaire aigin. — Ethocarcitie rhumatismeal. — Piegnom peri-utérin. — Ethocarcitie rhumatismeal et de l'oraire. — Métrie parachymatesse. — Rhumatisme débranant — Tuberoulous des ganglions pulmonaires — Insuffiasce mitrale od-Athèrences pleuro-costales — Diabéte — Oir schlesse de de l'oraire de Athèrences pleuro-costales — Diabéte — Oir schlesse de l'oraire de l'archivent de l'archivent

Chargé d'un cours pratique de clinique, l'auteur donnait deux malades à examiner per séance — Les élèves les étudiaient de l'une à l'autre conférence, les exposaient publiquement et, après avoir fast la critique, l'auteur les expliquait à son tour.

# TRAVAUX ORIGINAUX

#### PREMIÈRE SECTION

COMMUNICATIONS AUX SOCIÉTÉS SAVANTES

A. - Société d'hygiène publique de Bordeaux.

Nº 1 Communication sur deux cas de contagion de fièvre typhoïde par le lait,

(Revue sanitaire 1886)

Exposé au point de vue épidémiologique de deux observations de fièvre typhotde causées par le lait. -Observations analogues à celles publiées par Murchison pour le quartier de Marylebone.

N°2 Hygiène scolaire. Sur une épidémie de pneunomie contagieuse dans une école, corollaire au travail de Penkert

(25 mai 85, N. 86, pages 89).

Cette communication, parue dans la Revue sanitaire, sera analysée plus loin.

Nº 3 Communication sur les troubles cardiaques par intoxication tabagique professionnelle, et discussion :

> (25 février 1884 et 25 mars 1884) (Reinté dans la Revue, nº 82, page 63)

Exposé chimique et épidémiologique d'observations prises sur des ouvrières de la manufacture des tabacs. — Description et tracés graphiques des troubles cardiaques. — Résumdans un article de la Revue qui sera analysé plus loin.

Nº 4 Communication sur le résultat des vaccinations et revaccinations au 57° régiment d'infanterie en 1883– 1884.

(25 murs 1884).

Recherches concordantes avec les résultats obtenus en Allemagne dans les conditions analogues.

#### Société d'Anatomie et de Physiologie de Bordeaux

Nº 5 Culture du Microbe de la fièvre jaune en collaboration avec le D' Issartier

Le D' Issartier a apporté de Rio de Janeiro des pièces anatomiques présentées à la Société et, dans des flacons autiseptiquement bouchés, des liquides provenant de malades atteints de vomito negro. L'auteur a puy sioler un microbe dont il fait voir des cultures pures, mais sur lequel il ne beut nécessairment formuler une sozinion.

Nº 6 Présentation de pièces anatomiques sur une forme non décrite de syphilis cardio-pulmonaire avec malformations dentaires.

En collaboration avec le D' Rivals,

(avril 1889).

(1886).

Les pièces présentées et les dessins se rapportent aux modifications deutaires dont l'aboutissant est la dent d'Hutchinson et que l'auteur a été le premier à décrire. Nº 7 De l'Akoriomycose — Gale des tisseurs de paille — Présentation de trois malades et de photographies En collaboration avec M. Faguet, interne des hôpitaux.

(Société d'Anatomie et de Physiologie

Cette question fera l'objet de la thèse de M. Gardette, qui publiera et les observations et les photographies. En ce moment, l'auteur travaille à isoler le microorganisme.

N° 8 Du microbe de la diphthérie. — Présentation de cultures et de pièces.

.....

Les cultures présentées sont le résultat de recherches poursuivies depuis plusieurs mois. Le microbe isolé y est pur, la culture caractéristique, des inoculations à des gallinacés et à des lapins ont donné des résultats concluants.

Nº 9 Présentation de pièces anatomiques et dephotographies, résultat d'expériences cadavériques faites en février et mars 1890.

En collaboration avec MM. Woolonghan, Cornet et de Sardac.

(Mars 1890).

Deux commnications dont les conclusions seront publiées in extenso.

#### DETIXIÉME SECTION

Nº 10 Du pneumothorax chez les phthisiques et de son treitement. -- Thèse de Paris 1880.

> Cette thèse contient d'abord l'étade clinique du pueumothorax; puis, dans un chapitre d'ananonie pathologique accompagué d'analyses, les variations quantitatives des gaz contenus dans l'épanchement. Ces modifications peuvent toutes se comparer aux modifications de l'air mis en contact en espace dos avec des muscles ou travuil.

> Les analyses des gaz pleuraux forment la partie vraiment originale de la thèse. Quant au traitement, très prudemment formulé, il ne s'écarte en rien des principes ordinairement suivis.

> L'auteur cependant désirerait voir opérer d'une façon plus hàtive et plus complète, et à ce sujet cite les résultats obtenus par Hamilton Roë.

Nº 11 Deux observations d'otite, -- (Thèse d'agrégation d'Albert Robin, -- 1883),

Ces deux observations d'otite accompaguée de cario du rocher notent, dans la première, accompagnée de méningite, des oscillations de deux degrés; et, dans la deuxième (abcès du cervelet) un ahaissement brusque de 4 degrés et 1/2.

(Thèse d'agrégation de Robin, intitulée Des affections cérébrales consécutives aux lésions non traumatiques du rocher et de l'appareil auditif).

Nº 12 De la pleurésie septique, in-8° de 100 pages. J. B. Baillère - Paris 1882.

Co travall content les observations de pleuréeis especies imporpares journe just est publication l'auteurée. Le l'interprétation à donner aux faits relatées; il yjoint quarte observation personnelles très circussancées, avections autopaises. Toutes oes observations concordantes, prises dans unippa ée ump rête court relativement, ful paraissent devoir taire remplacer le sons de pleuréeis sur-aignée donne pur d'autres auteures par celui de juventées septique :

« La lésion pleurale, dit-il, n'est que l'une des manifestations de la septicémie aigüe qui emporte le sujet.

« L'empoisonnement septique est à ce point indiscutable que, dans deux observations après thoracentèse, le liquide ne se reproduit pas, et la maladie n'en suit pas moins son cours à i-sue fatale » Dans l'observation (1) de ce travall et l'autopsie qui l'accompagne se trouvent notés les faits suivants non décris : impossibilité absolue d'avuler avant thorsocetés par contrature a pasmodique pharyngienn. Ce fait touve son excitation, à l'autopsie, dans une congestion très promocés et des hémorrhagies purotifornes dans la région des racines du noyau du poeumogastrique dans le plancher du quarrième venticule.

# Nº 13 De la désarticulation scapulo-humérale. (Paris 1882).

Dans ce mémoire, après un exposé complet de tous les travaux parus sur la question, l'auteur cité des observations personnelles avec leur résultat prochain et leurs suites éloiguées, qui lui font admettre comme le meilleur procédé opératoire celui de D'e-L'arrey, légérement ambiéré en tant que l'incision autérieure est rapprochée légérement en avant.

#### Nº 14 Des asphyxies toxiques.

(Thèse d'Agrégation. — Concours de 1888. — Section de Médecine).

Après avoir établi ce qu'il faut entendre par asphyxie toxique, l'auteur étudie comme asphyxie toxique type l'asphyxie par l'oxyde de carbone. Il cousacre un chapitre spécial aux asphyxies des mines de guerre (1); établit les

<sup>(</sup>I) Cre nordents sont, an effet, incomplishment comes, or an langue française is graduated use on, an moment of Papparhine for otte thine, qu'en attende to therefore court de M. le De Rigards, médoum militaires. Unaisser quante o l'occasion de voir des non de ou gener, établic un point de rea symplematique que cette applyris post être divisée ou les moles solvents : rive monoscient, obphilaigue, convariances conference particular porte des propriets post être divisée ou les moles solvents : rive monoscient, obphilaigue, convariances convenients post de product solvents convenients de products de pro

différences de symptomatologie suivant l'origine de l'oxyde de carbone, et consacre une étude distincte aux accidents par les poèles, à ceux par les réchauds et à ceux produits par le gaz d'éclairage.

Un autre chapitre traite des accidents consécutifs, Puis vient l'étude des asphyxies chroniques par l'oxyde de carbone,

L'auteur traite ensuite de l'asphyxie par l'hydrogène sulfuré.

Enfin, un chapitre précédant les conclusions établit la physiologie pathologique des accidents asphyxiques par l'acide nitreux et les antiseptiques : chloroforme, éther, etc.

Nº 15 Contribution à l'étude de la séméiologie de la rétine.— Lésions artérielles dans les maladies générales.

Annales de Hairion et Wartomont, 1884, pag. 237 et suivantes

Étude clinique au point de vue de l'interprétation à donner aux hémorrhagies réfiniennes et leur valeur comme signe propostioue.

Toutes les observatons cirles dans le travail, an nombre d'une vinguino, sont personnelles et out été prises dans le service de la clinique du D'Badai. L'auteur établit ainsi que l'Hémorrhagie r'hémorrhagie se pithéliale que dans la népritte interstitielle, et que sunt reammistra, elle est le répritte d'une l'esion qui lui est commune avec toutes les artères encelhaliques.

Nº 16 Troubles cardiaques per l'intoxication tabagique pro-

(Revoe sunitaire de Bordeaux 1884). (25 Styrier nº 6 n. 47. — 20 mars nº 8 n. 57.)

Les symptômes observés sont : intermittences des battements du cœur et du pouls, sans: lésion organique. Pour la première fois, l'auteur décrit ces troubles pathologiques, identiques à œux des fumeurs.

Retentissement sur les fonctions utérines ; avortements pendant travail au tabac; plus tard, les mêmes femmes soustraites à l'intoxication ont des grossesses à terme.

Nº 17 Contribution à l'étude séméiologique des hémorrhagies du fond de l'œil.

(Gaz hebd., de Bord., 6 Juillet 1884, n. 27), page 892 et surv).

Travail conçu dans le même esprit et pris aux mêmes sources que celui qui a fait l'objet de l'article paru dans les archives de Warlomont en 1884. — Mêmes conclusions sur des faits cliniques identiques.

 $N^{\circ}$  18 De l'élément infectieux de la pneumonie.

(Gaz hebd. de Bord., 3 mai 85, nº 19, P. 180 et seq).

Traduction littérale du mémoire de Friedlander sur la question. Appréciation, critique.

## Nº 19 Des Microbes pathogéniques.

- (Gaz hebd. de Bord, 31 mai 1880 av 22, P. 219).

Analyse de l'ouvrage (les microbes pathogènes).

(Voir plus loin nº 38),

Nº 20 Meningite cérébro-spinale épidémique, Polyomyélite antérieure à forme curable.

> 56 vnc sanitaire de Nordeaux 30 mai 1884 n. 11 p. 89).

Tavail basé sur une observation longtemps prolongée. Cette observation est fort intressante et l'étude complète des phénomènes de réaction électrique après la polyomyélite y est faite pour la première fois.

Confirmation du phénomène de Baierlacher. Son interprétation.

#### Nº 21 Vaccinations et revaccinations.

(Revue sanitaire de Bordenux 1884).

Résultats déjà signalés. - Travail de statistique.

#### Nº 22 Sur les pneumonies épidémiques.

Revue sanctaire de Bordenux 1884.)

Déductions et observations cliniques et épidémiologiques. Après citation du mémoire de Penkert, et de quatre observations sur quarante-six. L'auteur le caractérise ainsi :

« Ce sont des doctrines Montpelliéraines qui nous reviennent de delà le Rhin et que les recherches anatomiques nous imposent petit à petit, alors que justement on s'était appuyé sur des recherches anatomiques pour les repousser, »

En résume : « Épidémie à peu près incontestable de pneumonie aigne. Que l'on diss épidémie de pneumonie, oui, mais pueumonie fibrineuse franche, c'est un peu risqué, etc., etc.

Nº 23 Recherches sur le microbe de la pneumonie.

(Gezette hebdomadnire de Bordeaux, 1885.)

Dans cet article, fait en collaboration avec le Docteur livals, l'autour fait une étude critique des notions déjà acquisses sur le microbe de la posemoné et dount of état des recherches qu'il poursuit en ce moment et qui ont été publiées la même année dans le volume intitulé les Microbes pathogénes.

N° 24 Sur la culture et l'inoculation aux animaux du bacillevirgule de Koch,

(Revoe sanzieire de Bordonux 1885.)

 $N^{\circ}$  25 Sur la contagion de la fièvre typhoide par le lait.

(Revue sanitaire de Bordeaux sissa

Analysé dans les comptes-rendus de la Société d'hygiène de Bordeaux.

N° 26 Sur la morue rouge. (En collaboration avec MM. Layet et Ferré, 1886).

> Etude micrographique et bactériologique sur le rouge de la morue.

> CONCLUSIONS: 1. Il existe à la surface de la morue atteinte de rouge dans les interstices des faisceaux musculaire superficiels, des organismes spéciaux, de nature végétale, qui constituent les éléments chromogènes.

 Ces éléments se rencontrent en amas, avec une substance granuleuse composée de granulations simples ou géminées de zooglées et de détritus.

3. Ces amas colorés se condensent plus spécialement à l'entour des cristaux de sel, paraissant pénétrer avec lui dans les interstices des faisceaux musculaires et gagner les petites excavations que nous avons décrites, alors que oes dernières viennent s'ouvrir à leur niveau.

En résumé, il résulte de ceste 1<sup>re</sup> série de recherches que le rouge en lui-même ne saurait être incriminé dans le cas d'accident par la morue altérée, l'altération toxique dépendant absolument de l'état de décomposition putride de cette morue. (25 avril 1886).

#### Nº 27 De l'actinomycose,

(Revue sanitaire, % avril 1885 nº 14, p. 63 of seq),

Classification des formes cliniques de l'actinomycose : 4 variétés: 1. forme cervicale d'emblée, de Firkect , 2. la pseudo-adénite sous-maxillaire; 3. la forme pulmonaire, le plus souveut secondaire et à marche extensive; 4. forme cutanée envalnissante.

N° 28 Les microbes pathogènes — Leçons professées à la Faculté de Médecine de Bordeaux en 1885.

Masson, Paris, in 8-300 pages areo fig

Cet ouvrage est divisé en 18 leçons faites dans l'année scolaire 1884-85. Il forme le premier tiers d'un ouvrage devant comprendre l'étude de toutes les maladies microbiennes et traite d'un certain nombre, notamment de la tuberculose et de la pseumonie. La 1º lecon est une, étude critique de l'actinomycose

La 1<sup>re</sup> leçon est une, etude critique de l'actinomycos exposant sur cette question l'état de la science en 1885.

Agrès avoir, dans les trois chapitres suivants, duide les puircobes en général, la technique microbéenes et la méthode des cultures et inoculations, l'auteur consacre un chapitre spécial à un essi de thérapestique microbéenes genérale. Dans cette leçon. Il se raille complètement aux doctries que M. le Professeur fol. Bouchard viend d'exposer au Congrès de Copenhagus. L'auteur a poursairi depuis ces recherches, toutamment pour le traitement de la feivre typhode et de la diphthérie. (Thèses de Robin, Bordeaux, fév. 1869, et Jean, Bordeaux, fév. 1890). Ensuite l'auteur étadie le bacille de la tuberculose et sa topographie. A ce propos, il publie des recherches personnelles sur la constitution anatomique de la base du ceur, recherches confirmatives des travaux (de Parchappe et de Parrot.

Il consacre un chapitre spécial aux rapports de la scrofulose et de la tuberculose. Un autre à l'inoculabilité et à la prophylaxie de la tuberculose. Il shorde ensuite l'étude de la nonumonie, qu'il considère

comme maladie infectieuse générale, maladie épidémique, maladie contagieuse et inoculable. Il étudie ensuite a microbe de la pneumonle, fait létude critique complete de tous les travaux parus sur la matière, et fait connaître les recherches personnelles poursuivies dans les laboratoires de physiologie et de Médecine expérimentale de la Faculté pendant l'année précédente.

L'auteur conclut de ses recherches personnelles que le microbe de la pneumonie est un bâtonnet effilé à une extrémité, encapsulé et pouvant se trouver dans le sang.

L'auteur croit avoir demontré que la la pnéunonie est une maladie générale d'abord, locale secondairement, dont la germe se trouve primitivement dans le sang et à la localisation pulmonaire secondaire.

Des recherches ultérieures n'ont fait que le confirmer dans cette idée.

Cet ouvrage a été analysé dans les journaux suivants : Gazette hebdomadaire des Sc. méd. de Bx., par M. le professeur Picot, 1885, p. 276 et 277.

L'éminent professeur de cilinique formule ainsi son appréciation : « On lira avec profit, même après cette œuvre magistrale. (les Bactéries de Cornil et Babès), le travail de M. Arugalas, parce que dans chaque ouvrage la question est traitée à un point de vue spécial; MM. Cornil et Babis, ont es aurout pour but de faire un ouvrage dogmatique sur les microbes des processus infectieux; M. Artigalas traite surtout des maladies infectieuxes, et à propos de ces maiadies, du selvzomyoble, qui en sels esubstratum anatomique.»

Dans la Gazette Médicale de Paris, par le Docteur Juhel-Rénov (1885)

Dans le Journal de Lucas-Championnière; Dans le Médical News; Dans le Journal Médical de Montréal Canada).

Il est cité, depuis la publication, dans à peu près tous les ouvrages qui traitent des questions microbiennes.

N° 29 Recherches expérimentales microbiennes sur le choléra.

Dans cotte thèse, couronnée par la Faculité, le D' Treille rapporte neuf expériences d'inoculation du bacille-virgule de Koch aux lapins. La 1<sup>re</sup> par injection d'une culture pure dans le duodenum après la parviornie. Les autres par injection dans l'estomac préalablement lané avec une solution alcaline de 3 à 4 centimètres cubes, d'une culture pure étendue au cinquième.

Le résultat de toutes ces expériences est constant. La mort arrive après un nombre d'heures restreint et on trouve toujours du bacille-virgule dans l'intestin.

Une dernière conclusion que des recherches inédites ont depuis confirmée, est ainsi formulée (thèse loc. cit. p. 71): « Le bacille-virgule n'amène pas la mort par lui-même, mais bien par un produit septique spécial, issu de la réaction sur les tissus organiques».

N° 30 Observation de spléno-pneumonie et pleurésie à épanchement.

(Gaz hobd, des sc. méd, de Bordeaux, nº 13, 25 mars 1888 p. 152 et suir, nº 14)

Observation très détaillés d'un cas de spikon-peumonis gauche, avos leger épanchement pleural, diagnostiqué, évacué par tiboracentées. Les modifications de l'Aire de Trube y sont très bien édonotrées avant et après la thoracenthèse. Cette observation prouve d'une façon indubitable, cequi distait mocres à édonotrée, que la spikon-puamonis gauche s'altier en rien l'angle extrem de l'Aire de production de l'Aire de l'Aire de l'aire en rien l'angle extreme de l'Aire de productions modifiés immédiatement. On y transcription des une particularité non excert décrite du tout de precues de l'aire d

la partie supérieure du poumon qu'il comprimait est devenue emphysémateuse et a donné le bruit de pot fèlé, quoiqu'il soit démontré par le contexte qu'il n'y a pas de pneumo-thorax.

## Nº 31 De l'antisepsie médicale.

Deux leçons faites à l'hôpital St-Audré et publiées dans la Gazette hebdomadaire des Sciences de Bordeaux.

> (28 sept. 1888 no 30, page 458 et seq.) (30 sept. 1888 no 40, page 471 et seq.)

Ces deux leçons, corollaire cliuique des recherches de thérapeutique microbienne commencées par l'auteur en 1882, sont l'exposé didactique des doctrines que, pour la première fois M. Ch. Bouchard, exposa au congrès de Copenhague. Les conclusions suivantes les résument:

1º Le corps fabrique normalement des ptomatnes : elles premet s'acommier dans on intérieur et produire des accidents lorsque l'oxygène qui doit les brûler fait defaut, on que les voies d'ilimination que elles doivent suivre sont obstruées. De la, deux grands principes d'antisepaie physiologique : 1º maintenir les oxydations al a normale; 2º maintenir les sécritions a la normale, ou bien établir leur balancemale, ou bien établir leur balancemale.

- 2º Lorsqu'une maladie microbienne est constituée, elle est ou locale, ou générale L'élément morbigène prolifère de preférence dans certaines régions et verse là les produits toxiques formés. De là:
- A. Nécessité de rechercher un antiseptique diffusible comme l'est le sulfate de quinine pour le microbe de la fiévre intermittente.

B. Changer le milieu où prolifèrent les microbes (antiseosie intestinale dans la fièvre typhoïde).

C. Faire autant que possible l'antisepsie des voix d'élimination secondaire des microbes et ptomaînes formés (néphrite de la sosriatine et du choléra, etc).

#### Nº 32 Pathogénie de l'urémie,

Deux leçons faites à l'hôpital St-André en 1888 et publiées in Gaz. hebd. des Sciences méd. de Bordeaux.

(4 nov. 1888 nº 45, page 534.) (11 nov. 1888 no 46 page 546.)

Exposé de la Science sur l'urémie — Chimie des ptomaînes et des leucomaînes.

La première leçon prund pour base la définition de l'uterine donnée parch. Boubart en et 1896, et a seconde, après un exposé physiologique complet de la question, prend pour constaio custe même définition : (L'uterine de su me mipoisonnement par tous les poisons sottnormalement lutroulis dans l'organisme, soit pathologiquement daborés par fuil poudros paralles, actes que leur excrétion dans le même laps de temps ent rende impossible par une lésion dos retinol.

# N° 33 Quelques remarques sur la Trachéotomie.

(Gan. hebd. des So. méd. de Bordeaux n° 47, page 557 et seq. -- 18 nov. 1888)

Cet article est l'exposé didactique très précis et très circonstancié, du Manuel opératoire de la trachéotomie et fait partie d'un travail traitant la question a fond, encore inédit C'est un travail de vulgarisation, destiné par la précision de ses détails, à servir de guide aux élèves.

Nº 34 Trois observations de péricardite à épanchement,

in (Thèse de L. Cuillé, -- Bordeaux 1888)

Ces trois observations très détaillées (24 p. in-47) prouvent que la péricatifié de épachement a comme symptome pathogomonique constant la disparition de l'angel interne de l'aire de Traube. Elles donneurest géalement que le premier symptone subteceptique de l'épachement péricardique est l'apparition dans la pareir postérieure de l'hémithorax guelle, au dessous de l'angle de l'omophic, d'un quadrilaiter tympanique à vibrations assoundies, et murmure vésiculaire diminué.

N° 35 De la Symphyse cardiaque. — Deux leçons cliniques faites à Phôpital Seint-André et parues dans le Journal de Médecine de Bordeaux.

> (Décembre 1888), (Décembre 1888),

Les leçous ont eu pour objet un malade très intéressant dontl'autopsie a été faite depuis la publication. Cette autopsie, du resté, a confirmé complètement les déductions cliniques. D'après cette étide, l'auteur assigne à la symphyse cardiaque les symptômes suivants: Dépression systolique des espaces intercostaux péricardiques. — Reptation systolique. — Propulsion diastolique. — Abaissement et fixation de la pointe du œur, etc.

No 36 Observation de diphthérie pharingée guérie par le benzoate de soude.

(Thise de Robin. — Bordoux 1389)

Cette observation démontre l'action du biscaste de acude sur l'albuminurie dans la diphthérie, la durée de l'action locale du benroate qui s'épuise à peu prée dans une heure, la possibilité d'élimination de fausese membranes gaugnée neueues avec les accidents consécutifs les plus redoutels, efficient par la continue de soude de l'archive de l'action générale, grâce à l'emploi du benroate de soude.

N° 37 Traitement de la fièvre typhoïde par le naphtol B et le benzoste de soude.

Leçon clinique faite à l'hôpital Saint-André et résumée (Thèse de Roten 1888, --- Pages 25 à 84 )

Comme le démoutreut les observations relatées à la fin de la thiése, et prises dans le service hospitalier dout l'auteur était chargé à ce moment, le naphiol B et le beuroute de sonde combinés au traitement totorque et formulés a lanis qu'il csi dit, sont très probablement les meilleurs agents thèrepertiques. L'auteur formule ainsi an opinion : « Empéher la pullutation des microbes, annihiler l'effe des propriées produites, souteuir l'organieme par tous les moyensproduites, souteuir l'organieme par tous les moyensconnus, tel est le but unique, malgré sa multiplicité apparente, proposé au médecin.

Nº 38 Technique de l'emploi du benzoate de soude dans la diphthérie après trachéotomie.

(Thèse de Bobin 1888, --- Pages 41-56).

Exposé circonstaucié de l'emploi du benzzote de soude après trachétotmie, ainsi qu'il a été employé dans soixante case et aves soxos. Le médicament est pulveries du fond de la gorge au moyen d'un Richardson. Une marmite de Lucas-Champitonnière en vaporise dans la chambre constamment.

Nº 39 Recherches expérimentales cadavériques sur les éponchements péricardiques.

Thèse de L. Cuillé 1888, avec trois béliogravures.

Les expériences out consisté à ligiceter dans le péricarde de calavres lintacés dont les poumons avaient été insuffiée d'air, une matière solidifiable. Les sujets ont été ensuite congelés dans la glacière de l'Institut anatomique. Les constations anatomiques ont été identiques aux édécutions étiaiques. Collection queditaire postérieur initiale. Encoche internét supérieurs de l'espa-e de Traube, voussure périenzique, etc., etc.

N° 40 Sur les symptômes thoraciques initiaux de la tuberculose pulmonaire.

(Thèsa da Jolia 1897.)

La plupart des observations (XVIII) consignées dans ce travail ont été communiquées par l'auteur; les autres prises dans son service sous sa direction. Appéteiation et vérification clinique de la valeur de la transsonance-leur culaire des modifications des rythmes respiratoires. Dimonstration clinique d'un schéma de debut de tuberculisation pulmonaire décrit dans cette thèse.

Conclusion. — Il faut, dans tous les cas de soupçon de unberculose pulmonaire, examiner et mettre en parallèle, pour l'examen du sommet, la sonorité, la vibratilité, la respiration, la transsonnance métallique, l'état des ganglions trachéo-bronchiques et examiner œux-ci à la percussion directe et à la percussion par transmission

Deux schemes différents initiaux avec les développements du mal, les schemes varient. Le 1 $^{\circ}$  symptôme de tuberculose pulmonaire est donc T - ou G  $\rightarrow$ . Il faut donc toujours chercher ces 2 signes.

Il y a probablement 2 variétés cliniques de tuberculose pulmonaire selon que le début est G - ou G +. Il faut donc toujours commencer l'examen par G, puis par T-

En résumé : « Ne jamais négliger les ganglions bronchiques et la transsonnance métallique à un premier examen. Nº 41 Observations d'adénopathie trachéo-bronchique hérédosynhilitique.

(in Thèse de V. Dufauro, 1887).

Pour ce travail, l'auteur a communique des observations poursuitées pendant plusieurs années et qui lui on promis d'établir la symptomatologie pathogonomoique de l'adénopathie urachéo-brouchique hérédo-syphilitique qu'il est le penmier à décrite. Sa description permet de différencier nettement l'affection des autres poeumopathies hérédo-syphilitiques, avec lesquelles elle éxit confondats.

Nº 42 Dix observations de fièvre typhoïde traitée par l'acide phénique, prises en 1882 à l'hôpital militaire Saint-Martin, Paris, publiées.

(m Thèse de Jean, Bordenux 1890).

Cas observations out été le commencement des recherches un la théraqueique antiseptique que, d'appela les icides de Ch. Bouchard, l'austeur a poursuiries depuis 1888. Elles ont été cholisies parmi 105, prisse dans le service du l'Utoplaté que l'acide phénique est un bon antiférmentescible intestince que l'acide phénique est un bon antiférmentescible intestinuis la piomanishemente, et, sans racouveir la durie de la malacie, emphéhe l'empôsonamente de l'organisme. Es tous carpolic associations de la malacie, et de l'acide de l'acide de la malacie, et de l'acide de l'acide de l'acide de la malacie, et de l'acide de l'acide de l'acide de la malacie, et de l'acide de de 30 pour 100.

Nº 43 Trois observations de non développement des cordons antéro-latéraux de la moelle,

> Ces trois observations, rapprochées d'une quatrième prise dans le service de l'autour par lo D' Gardis, ont servi à établir une maladie dont les caractères ont été ainsi qu'il suit résumés dans une conférence clinique faite à l'hopital Saint-André au commencement de l'année 1889, et dont la thèse du D' Gardie rest que le développement.

> Reiard de dévolopement, tant au point de une physique qu'un point de vue intellectuel, marche tantier, faitheur qu'un point de vue intellectuel, marche tantier, faitheur musculairs genérale avec atrophie marqués; absence presque aboute de certains groupes musculairs, controlle que aboute de certains groupes incertitude et incoordinate ou dans les movements; démarche tilbuntes, pas infégurar y equitainme et ensellurs; déformations ertainemes, dentaires, seasabilité générale conservé.

Début dès la plus tendre enfance, atrophie observée d'abord dans les membres supérieurs, gagnant les membres infárieurs ensuite; jamais de réaction inflammatoire; les troubles se sont établis insensiblement.

Ces observations sont accompagnées de photographies instantanées (représentant les malades dans différentes attitudes.

Nº 44 Observations d'hérédo-syphilis pour l'évolution des

(Thèse de Deamartin, Paris, 1889).

Cette thèse contient onze observations que l'auteur a sui-

vies pendant plusieurs années et qu'il a communiquées au docteur Descrartin

Ces faits établissent la transformation, suivant l'âge, des malformations deutaires dont le type adulte est depuis longtemps comus sous le nont de dent d'Hutchinson. Ces recherches, personnelles à l'auteur, sont résumées dans les ongelusions suivantes:

 $1^{\rm o}$  Ou observe dans la syphilis hériditaire des malformations et érosions dentaires essentiellement variables solon leur âge ;

2º La première dentition est presque toujours intacte; 3º Les malformations apparaissent à la seconde dentition

4° Les malformations sont : Macrodontisme et convergence des incisives supérieures.

Nanisme des incisives latérales supérieures. Cannelures, en général au nombre de trois, pour les incisives médianes supérieures et pour les incisives médianes inférieures.

5º Le bord libre des dents atteintes, au lieu d'être coupé net comme à la normale, est tricuspidé, Ajoutons que les dents sont atteintes d'amorphisme, c'est-à dire que leur forme ne répond pas au type que leur siége leur imposerait.

Dés l'emergence de la dent horts de la geocive, ou peu après, apparaissent sur la face antérieure des érosions peu profondes, circulaires ou ovalaires, à fond jaunaitre, qui n'atteignent au commencement aucun bord libre de la dent. Elles apparaissent d'abort sur la face antérieure des incisives médianes supéristres, et ceta le plus fréquemment. Les incisives inforieures ocuvrent usus être atteinieur.

L'usure fonctionnelle, les traumatismes journaliers de la mastication, les fermentations buccales creusent et élargissent sans cesse ces érosions. Le tissu dentaire s'ammon, puis casse. Les incisives médianes supérieures deviennent des dents d'Huchinson; les incisives inférieures se rasent; puis, plus tard eufin, des dents malados il ne reste plus que des troncons.

6° Toutes ces lésions et malformations sont sous la dépendance de la syphilis héréditaire, ainsi que le montre l'examen des malades qui les présentent.

Nº 45 Séméiologie de l'Aire de Traube, in 8º avec 17 figures dans le texte et 3 héliogravures — Masson, Paris 1889.

> Ce travail, absolument original, est l'exposé de recherches cliniques longues et circonstanciées sur un point spécial de la percussion du thorax, point sur lequel, avant ce mémoire il n'existait que quelques éléments.

> n n'existat que querques esmentes.
>
> L'anteur étatie d'abord l'anatomie de l'Aire de Traube, et, pour la 1<sup>se</sup> fois en donne des figures suffisamment nombreuses et faites selon les plans divers, de façon à bien en établir la tonographie.

Dans les chapitres suivants, il étudie les variations physiologiques de l'Aire de Traube, suivant les différents stades respiratoires --- suivant les variations de l'estomac.

Modifications pathologiques de l'Aire de Traube-Maladies de la plèvre et du poumon -- Pleurésie gauche -- Splénoppeumonie -- Péricardite avec épanchement.

Variations de l'Espace de Traube dans les affections stomacales --- Différenciation des tumeurs de la rate et du grand cul de sac de l'estomac — Variations de l'aire de Traube par changement de volume ou de position du foie — Maladies de la rate — Maladies du rein gauche et de l'Angle du colon.

Nº 46 De l'Akoriomycose. — 3 observations avec photographies. — (Mémoire sous presse).

> Cette malarie non décrite ressemble asser à la gale acrienne et alossers sur les gens travaillant la paillé numirienne et alossers sur les gens travaillant la paillé numitels que les rempailleux rife chaises. L'uniteure na vu quélques observations en 1858, et enfin les trois deraillers ou déobservées à l'hapital des enfants en noti 1800. Les malades et les photographies des lésions ont été présentes la Société d'Annionnie et de Physiologie de Bordeaux, nar M Farquet, juterna.

Nº 47 Observation de vaginisme guéri par la cocaine.

Cette observation est un exemple de vaginisme d'origine nerveuse qui céde trés facilement à l'emploi des sédatifs.

# TRAVAUX INSPIRÉS

Bourdon .-- De la pleurésie infectieuse, 9 mars 1887.

JULIA. — Sur les symptômes thoraciques du début de la tuberculose pulmonaire, 17 juin 1887.

Dufourc (V). -- De l'adénopathie trachéo-bronchique hérédo-syphilitique, 1887.

 ${\tt Venner\_-} De \ la \ d\'esarticulations capulo-hum\'era \ le \ 1889$ 

COLLS. — Des variations pathologiques de l'Espace de Traube dans la péricardite avec épanchement, 13 juillet 1888.

Treile -- Critique historique de la théorie microbienne du choléra, 1886. ROMIN — Naphtol B et benzoate de soude dans la fièrre typhoïde. – Benzoate de soude dans la diphtérie, 22 fierier 1889.

BAYSSELANCE. — Contribution à l'étude de la trachéotomie chez l'enfant.

Jean (Athanase.) — Etude critique sur la médication phéniquée dans la fiècre typhoide, 21 férrier 1890

 $\begin{array}{l} {\rm Desm_{ARTIN}-Duvion_{AUD}}. & - \textit{Brolution infantile des dents} \\ \textit{hérédo-syphilitiques}, 1889, Paris. \end{array}$ 

Garrie. — Non déceloppement hérédo-syphilitique des cordons antéro-latéraux de la moelle, 1889, Paris.

FORGET. — De la syphilose pulmonaire, 1890.

Letellen. — Contribution à l'étude de la bronchoalcéolite fibrineuse hémorrhagique, 20 Juillet 1888.

